

## НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАННЕЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Беспорядочные половые связи в любом случае несут большой риск заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).

Презерватив только снижает вероятность передачи ИППП, но не гарантирует защиту от них.

К ИППП относят не только венерические болезни, такие как сифилис и гонорея, но и ВИЧ, СПИД, вирусные гепатиты В и С, генитальный герпес, уреаплазмоз и микоплазмоз, хламидиоз, цитомегаловирус, вирус папилломы человека (ВПЧ).

Многие из заболеваний, передающихся половым путем, протекают бессимптомно.

Наибольшая угроза заразиться ИППП возникает при частой смене партнеров.



# ЗАЩИТА – ЭТО ПРОСТО



### Прочие негативные последствия ИППП:

- ▶ Развитие бесплодия в результате хронического воспалительного процесса половых органов.
- ▶ Эрозия шейки матки, которая в дальнейшем может вызвать рак шейки матки.

**Природу не обманешь.**  
В результате сексуальных отношений в любом случае может произойти зачатие ребенка.

Доказано, что интенсивная половая жизнь в молодом возрасте своим последствием имеет преждевременное прекращение половой активности в зрелом возрасте.

Раннее начало половой жизни неблагоприятно сказывается на потомстве.

Ранний секс – это стресс для психики, эндокринной и нервной систем подростка.



### В результате этого стресса:

- ▶ Отмечаются перепады в настроении, склонность к постоянным сомнениям, самообвинительным реакциям, пониженное самоуважение, а также чрезмерная чувствительность, развиваются комплексы.
- ▶ Возникает повышенная тревожность, раздражительность, чувство усталости, вялость, апатия.
- ▶ Возникают подростковые депрессии, которые могут привести к суициду (девушки, вступившие в сексуальные контакты в подростковом возрасте, совершают самоубийства в 3 раза чаще, чем их ровесницы).
- ▶ Развивается неспособность построения гармоничных отношений.



### ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРВОГО АБОРТА

1. 25% женщин после первого аборта отмечают большие трудности с зачатием, могут стать бесплодными;
2. высокий риск инфекционных осложнений после абортов, которые приводят к хроническим воспалительным процессам в женской репродуктивной системе и как следствие – к бесплодию;
3. некоторые женщины в дальнейшем испытывают страх близости, развивается фригидность;
4. повышается риск заболевания раком молочной железы.

**#ТЫ СИЛЬНЕЕ**  
МИНЗДРАВ  
УТВЕРЖДАЕТ.

**8 800 200 0 200**  
**TAKZDOROVO.RU**

**Чтобы заразиться, достаточно одного полового контакта**

**УЗНАЙ ВСЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ  
ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 800 200 0 200  
ИЛИ НА САЙТЕ TAKZDOROVO.RU**